



Urbani, Malvina (1992) *La Sezione Ligia (Fasano) Meisn. del genere Thymelaea P. Miller (Thymelaeaceae) in Italia*. Giornale botanico italiano, Vol. 126 (2), p. 391. ISSN 0017-0070.

<http://eprints.uniss.it/7849/>

# GIORNALE BOTANICO ITALIANO

FONDATO NEL 1844



PUBBLICATO DALLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA  
CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Vol. 126, n. 2, 1992

**Società Botanica Italiana**

**87° CONGRESSO**

SASSARI  
29 settembre - 3 ottobre 1992

M. Urbani  
Dipartimento di Botanica ed Ecologia vegetale.  
Università di Sassari  
Via Muroni, 25 - 07100 SASSARI

Nell'ambito del genere *Thymelaea* P. Miller (Thymelaeaceae) la sez. Ligia (Fasano) Meisn., nell'accezione proposta da TAN (Notes R.B.G. Edinb., 38:149-164, 1990), comprende sei entità delle quali quattro annuali, tutte afferibili al complesso *Thymelaea passerina* (L.) Cosson et Germ. e due perenni, entrambe mediorientali e fortemente correlate tra loro: *T. aucheri* Meisn. e *T. cilicica* Meisn. Il complesso di *T. passerina* include i seguenti taxa: *T. passerina*, *T. gussonei* Boreau, *T. salsa* Murb. e *T. mesopotamica* (Jeffrey) Peterson. Tutte entità molto vicine sistematicamente e la cui circoscrizione si fonda su basi distributive ed ecologiche oltre che morfologiche. In questo ambito *T. gussonei*, può essere considerata una variante più meridionale e localizzata (area mediterranea, Crimea), mentre *T. salsa* (Algeria, Marocco, Spagna meridionale) e *T. mesopotamica* (Mesopotamia) invece potrebbero essere interpretate come taxa originatisi ai margini dell'areale di *T. passerina*, che si estende dall'Europa meridionale all'Asia centrale e all'India settentrionale.

Si è posto il problema di valutare la validità e la consistenza del taxon *T. gussonei* e la sua effettiva distribuzione in Italia, precisandone anche l'ecologia sino ad ora poco conosciuta. Si tratta di un'entità che, anche se in termini differenti dagli attuali, era stata riconosciuta in passato, ma della quale non si trova più menzione nelle flore italiane a partire dal 1898 (FIORI A. in FIORI A., PAOLETTI G., Flora analitica d'Italia, 1: 108-109). Questa indagine, condotta nell'ambito di ricerche di tipo biosistemático, tassonomico e corologico compiute sull'intera famiglia (URBANI, Tesi di Dottorato, 1989; Taxon 40: 493-495, 1991; Webbia 46(2): in stampa), ha portato alla circoscrizione delle unità sistematiche italiane e della loro distribuzione. Contemporaneamente è iniziata la tipificazione di tutti i nomi sinonimizabili con *T. gussonei* e *T. passerina* descritti su materiale italiano. Dato che nessuno dei caratteri considerati differenziali, preso singolarmente, è sembrato veramente esclusivo di una delle due entità, si è resa necessaria la ricerca di una combinazione di caratteristiche differenziali, che ha permesso di individuare due gruppi sistematici. Si è infine scelto, tenendo anche in considerazione le ipotesi sopra accennate, di mantenere per questi il rango tassonomico specifico.